

Kúpuskelin undir sjóneyku –  
at hyggja 400 ár aftur í tíðina

Vísindavøka 2018

Una Matras



**HAVSTOVAN**  
FAROE MARINE RESEARCH INSTITUTE

# Samstarvsfelagar

Havstovan:

Una Matras og Petur Steingrund

Uni Research Bergen:

Carin Anderson Dahl

Marine Research Institute in Reykjavik:

Guðrun G. Thorarinsdóttir

# 3 ára verkætlan (2014-2017)

Endamál: meta um stovnstøddina av norðhavssild  
100 til 200 ár aftur í tíðina

Fíggjað hava:

Fiskivinnuroyndir

Nordregio

Havstovan

Kavarar og fiskimenn hava latið kúfiskar til  
kanningina

# Tilfar

- Kúfiskur á Landgrunninum : 154 skeljar
  - Kúfiskur á Landgrunninum verður sera gamal. Flestu eru uml. 100-200 ár, meðan tann elsta er yvir 400 ára gamal.
- Kúfiskur úr Norður Noregi: 25 skeljar
  - 36 - 226 ára gamlar

# Kúfiskur / kúpuskel

## *Arctica islandica*

Tvískel

Búleikast í  
Norðuratlantshavi

Týðuligir árringar í  
skelini, vísa hvussu  
gamal kúfiskurin er


Kann gerast fleiri  
hundrað ára gamal

Tað djóraslagið sum  
livir longst



# Kúfiskur er tað dýrið sum livir longest

## Elsti kúfiskurin er 507 ár



Kúfiskur niðurgrivin í sand,  
bert tranturin sjónligur

- Verður 11 cm høgur
- Situr partvíst ella heilt niðurgrivin í botnin
- Situr á sama stað alt lívið
- Ferðast upp og niður í botninum
- Føðin er plantuæti
- Vakstrarløg eins og árringar í trøum
- Føroyskur kúfiskur 100-200 ára gamal, elsti 400 ár




# Árligur vøkstur

## Viðarbulur

Vøksturfyrsta árið  
Ár við nógvum regni  
Ár við lítið av regni  
Arr frá skógareldi



## Havsins træ



12 ára gamal kúfiskur


Kúfiskar og trø hava serligan áhuga innan fyri gransking av veðurlagsbroytingum

# Kúfiskur/kúpuskel



Øll vakstrarløgini  
eru eisini sjónlig í  
hongslinum


Nýggjastu  
vakstrarløgini  
eru úti við  
kantin








# Árlegur vøkstur í hongslinum




# Kúfiskur á Landgrunninum





# Vistskipanin á Landgrunninum



# Vistskipanin á Landgrunninum

## Tíðarseriur


- eru av stórum týdningi fyri hvussu vit kunnu skilja vistskipanina og hvussu vistskipanin er sett saman
- geva okkum møguleika at síggja broytingar í vistskipanini
- geva okkum møguleika at meta um vistfrøðina í komandi tíðum




# Dømi um tíðarseriur frá Landgrunninum eru:

- Plantuplankton frá 1990
- Djóraplankton frá 1990
- Stovnsmetingar frá 1960
- Hitamátingar frá 1873
- Fuglatøl frá 1711
- Grindatøl frá 1584
- Vøkstur hjá kúfiski Kann endurskapa tíðarseriur av plankton - fleiri hundrað ár aftur í tíðina

## Endurskapað tíðarseria av djóraplankton við Føroyar aftur í tíðina - samband við vøkstur hjá kúfiski




Kúfiskur og djóraplankton eta somu føði - plantuplankton




Hetta týðuliga samband ger tað møguligt at endurskapa tíðarseriuna av djóraplankton aftur í tíðina


# Vistskipanin er í stöðugari broyting



Nógvur uppsjóvarfiskur ↔ Nógvur botnfiskur



# Vækstur hjá føroyskum og norskum kúfiski





# Endurskapan av djóraæti í Norskahavinum


- Djóraæti, serliga reyðæti (*Calanus finmarchicus*) í Norskahavinum rekur inn á føroyska landgrunnin um várið og er grundarlagið undir nøgdunum av djóraæti við Føroyar
- Hetta ger tað møguligt at meta um nøgdina av djóraæti í Norskahavinum út frá nøgdunum av djóraæti við Føroyar (og vøkstri hjá kúfiski)
- Tó er neyðugt at taka hædd fyri tveimum støðum í vistskipanini (við- og uttan uppsjóvarfisk):

# Vistskipanin á Landgrunninum


## Boð uppá tvey sambond

- 1: Ongin uppsjóvarfiskur í apríl/mai:
  - Nógv djóraæti frá Norska havinum
  - Nógv fiskalarvur – eta djóraæti í botn
  - Nógv plantuplankton niðri við botn
  - Kúfiskur veksur væl
- 2: Nógvur uppsjóvarfiskur í apríl/mai:
  - Nógv djóraæti frá Norska havinum
  - Etur eitt sindur av djóraæti
  - Nógv djóraæti etur nógv plantuæti
  - Lítið av plantuæti niðri við botn
  - Kúfiskur veksur lítið


# Nøgd av djóraæti í Norskahavinum í 250 ár




# Sildatíðarskeið eru, tá nógv er av djóraæti



Djóraæti rokna frá vøkstrinum hjá kúfiski  
 Gýtingarstovnur norðhavssild - stovnsmeting  
 Veiðutøl av norðhavssild x faktor




## Toskur undir Føroyum fylgir nøgd av djóraæti í Norskahavinum upp til 1985





# Upsi undir Føroyum fylgir neyvt nøgð av djóraæti í Norskahavinum alla tíðina



# Niðurstøða

- Føroyskar og norskar skeljar geva ábendingar um, at vistfrøðin á Landgrunninum kann skiljast sundur í tíðarskeið við og uttan uppsjóvarfisk
- Týðiligar ábendingar um, at djóraæti stýrir nøgdunum av fiski á Landgrunninum
- Úrslitini kunnu hava týdning fyri MSC-góðkenning
- Neyðugt at fáa fleiri skeljar úr Noregi, fyri at staðfesta úrslitini, sum higartil eru fingin til vega



# Takk fyri áhugan

Stuðlað hava:

Fiskivinnuroyndir

Nordregio

Havstovan

Kavarar og fiskimenn

*Mynd Ingi Sørensen*