

# Sálarlig heilsa hjá føroyskum barnakonum undir viðgongutíðini og aftaná føðing

*Ein landsdekkandi tvørsektoriel  
granskingarverkætlan*

Sanne Storm, verkætlunarleiðari (PhD og Cand.mag í musikterapi), Psykiatriski Depilin

Annika Hoydal og Margretha Thomsen, ljósmøður, Ljósmøðratænastan

Sólrun Foldbo, heilsurøktarfrøðingur, fakligur leiðari hjá Gigni



# Yvirskrift fyrir hesa framløguna?

- › Bakgrund
- › Endamál
- › Mannagongd
- › Nøkur av teimum týdningarmiklastu úrslitunum

# Bakgrund

- › Gigni byrjaði 2012 at screena allar nýggjar mammur– *fyrsta landsdekkandi kanning vísti, at 18 % av fyrstuferðseigandi vístu tekin um føðitunglyndi í lættan til moderatan/sveran grad*
- › Praksis vísti, at tekin um tunglyndi og angist vístu seg longu í viðgongutíðini
- › Gransking uttanlanda: Tunglyndi og angist mest vanligu avbjóðingarnar hjá barnakonum. Týdningarmikið at fáa eyga á teknini tíðliga og at viðgera.
- › *Sálarheilsa hjá barnakonum í viðgongutíðini var ikki kannað fyrr í Føroyum*

# Endamál

- › Kanna sálarliga heilsu hjá fóroyiskum barnakonum *undir viðgongutíðini og aftaná føðing*
- › Kanna um *somu kvinnur*, sum eru sálarliga avbjóðaðar í viðgongutíðini, eisini eru tað aftaná
- › Shared-care – Ljósmyðratænastan, Gigni og Sertoymi Barnsburðartunglyndi



# Metoda

- Ljósmóðirtænastan –
  - *Eyka ljósmóðirviðtala við fokus á "Hvussu hevur tú tað?"*
  - *Screening*
- Gigni
  - *Screening eftir føðing*
  - *Dokumentatiónin – screeningsúrslitini verða funnin í arkivum hjá Gigni*
- EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale):
  - 0-9 stig= ongi tekin um manglandi trivnað
  - 10-12 stig= lött til moderat grad av risiko fyrir at fáa föðitunglyndi (tørvur verður røktur av ljósmóðirtænastuni og Gigni)
  - 13+ stig= sver grad av risiko fyrir at fáa föðitunglyndi (ávísing til Sertoymið barnsburðartunglyndi til nágreiniligi samrøðu)
- Eyka spurnarskemakanning

- › 736 fingu innbjóðing
- › 121 kundu ikki vera við
- › 191 takkaðu nei
- › 424 takkaðu ja (69%) – vísir ein sterkan validitet
- › Av teimum 424 luttakarunum voru 382 (90%) EPDS-screeningsúrslit funnin í arkivum hjá Gigni
- › (tað bar tí til at kanna tørvin áðrenn og eftir føðing)



# Úrslit av sálarheilsu undir viðgongutíðini

- › 18 % tilsamans av barnakonunum voru í vandabólki fyrir føðitunglyndi í løttum ella sverum gradi
- › 0- 9 stig= 82 % vístu ongi tekin um manglandi trivnað – og komu tí ikki í tann bólkin, sum fingu eyka samrøðu ella ávísing til sertoymi
- › 10-12 stig= 10 % vístu lættan til moderatan vanda fyrir føðitunglyndi. Ljósmøðratænastan bøtti um hendan tørvin
- › 13+= 8 % - allar fingu tilboð um ávísing til sertoymið barnsburðartunglyndi

# Úrslit av sálarheilsu aftaná føðing

- › 11 % í vandabólki fyrir föðitunglyndi í lættan ella sveran grad eftir föðing
- › 0-9 =**89%** vístu ongi tekin um manglandi trivnað
- › 10-12=**5%** vístu lött til moderat tekin um vanda fyrir föðitunglyndi
- › 13+=**6 %** vístu í sveran mun tekin um vanda fyrir tunglyndi

# Úrslit av komparativu kanningini

- › Hvattu avdúkaði tann komparativa kanningin?
- › 12% voru í löttum til sverum vanda fyrir tunglyndi undir viðgongutíðini – men ikki í vanda aftaná føðing
- › 5 % voru ikki í vanda fyrir føðitunglyndi undir viðgongutíðini, men voru í vanda aftaná føðing
- › 6 % voru bæði í vanda undir viðgongutíðini og aftaná føðing
- › Ergo: í flestu fórum eru tað ikki somu kinnur, sum eru í vanda í viðgongutíðini og aftaná føðing
- › Hettar peikar á týdningin av einum skjótum og heilsufremjandi innsatsi bæði undir viðgongutíðini og eftir føðing.

# Hvat eyðkennir bólkin sum bæði var í vanda undir viðgongutíðini og eftir føðing?

- › Søga við traumatiskum upplivingum áður
- › Upplivingar við misbrúki, tunglyndi, sjálvmorð, sjálvskáði í nærmastu familju
- › Høgt angist- og strongdarstig undir viðgongutíðini
- › Flestu høvdu havt eina sálarliga sjúku sum vardi meir enn 6 mánaðir

# Viðurskifti sum spæla ein leiklut í mun til angst, strongd og føðitunglyndi áðrenn og eftir føðing

- › Ungur aldur 17-24 ár
- › Fyrstuferðseigandi
- › Høgt angst stig ella stórur ótti fyri føðing
- › Søga við áður traumatiskum upplivingum
- › Sálarlig sjúka
- › Fáar sosialar relatórir

# Serføroysk viðurskifti – small scale society

- › At vera komin heim til Føroya ella fluttur til Føroya innan seinastu 3 árini
- › At búgva í húsið saman við foreldrum ella verforeldrum

# Áður traumatiskar upplivingar

- › 56 % hava upplivað traumatiskar hendingar áður
- › 45 % hava upplivað misbrúk, tunglyndi, sjálvmorð ella sjálvskarda í nærmastu familju
- › 15% hava upplivað traumatiskar føðingar áður

# Viðmælir frameftir

- › Framhaldandi tvørsektorielt, fleirfakligt samstarv
- › At veita fyribyrgjandi og heilsufremjandi stuðul móti angst, tunglyndi og strongd
- › Framhaldandi tilboð um screening í Ljósmøðratænastuni og Gigni
- › Bæði foreldur takast við
- › Lætta atgongd (fáar dagar)
- › Toymið skal hava sálarfrøðiliga, psykotraumatiska og psykiatriska vitan og royndir
- › Ein traumabaserað tilgongd og forstálisi hjá heilsufakfólki



# Túsund takk til:



- › Allar kvinnurnar, sum stuðlaðu, so hendar verkætlánin varð mögulig
- › Psykiatriska Depilin, Gigni, Ljósmøðratænastuna, Sjúkrakassagrðin/Granskingarráðið
- › Starvsfelagar, vinir, familja og mong onnur, sum hava stuðlað, uppmuntrað og hjálpt í dagligdegnum, á arbeiðsplássinum, til reflektión og nögv annað
- › Ask Elklit, Professara, leiðari av Psykotraumatiska vitanarcentrinum í SDU
- › Rapport kann lánast á bókasavninum og kann downloadast ókeypis á Gransking.fo
- › <https://gransking.cdn.fo/savn/kjlllj43/faeroeske-kvinders-mentale-sundhed-under-graviditet-og-etter-foedsel-sanne-storm-forskningsrapport-maj-23-5-2023.pdf?s=oDxpLfK8uQWwoG-bP-6EeR1Ysnl>

